

Состав и форма выпуска

Капли для глаз Iridina Due с пипеткой во флаконе 10 мл.

В одном миллилитре содержится 0,05% действующего компонента — нафозолина гидрохлорида.

Фармакологическое действие

Капли Iridina промывают глаза, отбеливают, убирают покраснения и желтизну. Также капли для глаз Иридина убирают усталость и увлажняют глаза. После закапывания капель в глаза их действие наступает сразу же, и эффект сохраняется на несколько часов.

Показания к применению

Иридина две можно применять при:

- раздражение глаз;
- появившемся жжении и зуде;
- покраснение глазных яблок;
- обильном слезотечении;
- недостатке влаги в глазу, то есть сухости;
- высокой чувствительности к яркому свету;
- чувство усталости глаз;
- чувство дискомфорта в глазах.

Способ применения и дозы

При раздражении конъюнктивы по 1-2 капли в каждый глаз до 6 раз в день, курс лечения 2-3 дня

Для снятия усталости и покраснения при симптоматическом лечении 1-2 капли в каждый глаз, но не чаще 3-4 раз в неделю.

Противопоказания

Глазные капли Иридина Две (Iridina Due) противопоказаны при:

- имеющейся непереносимости компонентов, входящим в состав капель;
- глаукоме.

А также детям и подросткам в возрасте до двенадцати лет.

Побочные действия

Глазные капли Иридина Две являются не токсичными, совершенно безопасными и, как правило, побочных действий не оказывают. Но в единичных случаях во время превышения допустимой дозировки наблюдались такие симптомы как:

- увеличение внутриглазного давления;
- небольшая головная боль;
- повышение артериального давления.

Беременность и кормление грудью

Не ограничивать использование во время беременности и лактации. Побочные действия

Повышение внутриглазного давления, гипертония, тошнота, головная боль, болезни сердца.

Передозировка

В случае передозировки при пероральном применении могут быть признаки депрессии на уровне центральной нервной системы, чувство холода на коже, тахикардия, сонливость, потливость, а также помрачение сознания.

Взаимодействие

Применять с осторожностью в случае лечения с антидепрессантами.

Особые указания

Если вы носите контактные линзы, то перед началом процедуры их следует извлечь, а одеть заново можно только через 15-20 минут после закапывания.

Не рекомендуется совмещать капли Иридина Две (Iridina Due) и другие антисептические средства для лечения глаз.

Не допускать прямого попадания на флакон солнечных лучей.

После открытия использовать капли в течение одного месяца. Если по истечению одного месяца капли во флаконе еще остались, то использовать их категорически запрещено.

Условия хранения

После вскрытия флакона хранить не более 28 суток при температуре не выше 25 градусов.

Условия продажи

По рецепту.