
Состав и форма выпуска

Слегка опалесцирующий раствор для внутримышечных инъекций красного цвета с характерным запахом.

Активное вещество: фосфолипиды коры головного мозга свиньи 12.0 мг, цианокобаламин 1000.0 мкг.

Вспомогательные вещества: лидокаина гидрохлорид, динатрия гидрофосфата додекагидрат, натрия дигидрофосфатадигидрат, эфиры кислоты п-гидроксibenзойной, вода для инъекций.

Фармакологическое действие

Парентеральное введение фосфолипидов из головного мозга свиньи, способно активизировать обмен веществ для нормальной деятельности мембранных ферментов нейрона, увеличить оборот нейротрансмиттеров, метаболизм глюкозы и эндогенных фосфолипидов. Цианокобаламин выступает в качестве специального сомножителя в метаболизме нервных клеток.

Фармакокинетика

Метаболическая доля и стабильность дважды меченных парентерально введенных фосфолипидов, была изучена с точки зрения оценки общей радиоактивности обнаруженной в мозге, и тенденция отношения $3H/14C$ на клеточном уровне. Исследования показывают, что эти молекулы стабильны на кровяном уровне, и достигают мозга целом.

Показания к применению

- травматические повреждения головного и спинного мозга
- неврит, полиневрит, в том числе токсический и алкогольный

Способ применения и дозы

Вводится по 2 мл внутримышечно один раз в сутки по предписанию врача.

Курс лечения: 15-20 дней.

Побочные действия

Не было сообщено о каких-либо побочных эффектах, которые могли бы быть отнесены к данному препарату. Возможны реакции гиперчувствительности

Передозировка

Не было сообщено о симптомах передозировки

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим веществам, сходным по химической структуре
- детский и подростковый возраст до 18 лет

Лекарственные взаимодействия

Сообщений о взаимодействии с другими препаратами не поступало. Не известны случаи несовместимости Трикортина с другими препаратами.

Особые указания

Беременность и период лактации

Данные о безопасности и эффективности применения препарата в период беременности и лактации отсутствуют, применение в период беременности и лактации не рекомендуется.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами. Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и рабочими механизмами.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C (не замораживать).

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

2 года

Не применять по истечении срока годности указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.